



**Organismo Andino de Salud
Convenio Hipólito Unanue**



SITUACIÓN ACTUAL DE LA PANDEMIA COVID-19 A NIVEL MUNDIAL Y EN LOS PAÍSES ANDINOS

**Luis Beingolea More
Bertha Luz Pineda Restrepo**

Lima, 14 de junio de 2021

50

**Aniversario
ORAS-CONHU**

Juntos somos más fuertes





Distribución de casos confirmados, fallecidos y letalidad por COVID-19 en regiones del mundo. 14-06-2021 08:34

Global/Regiones	Casos confirmados	%	Fallecidos confirmados	%	Letalidad (%)
Mundo	176,785,989	100	3,820,912	100	2.2
Europa	47,201,656	26.70	1,086,794	28.44	2.3
NA/CA/C	40,171,781	22.72	907,696	23.76	2.3
Asia	53,590,295	30.31	745,861	19.52	1.4
Suramérica	30,661,358	17.34	944,223	24.71	3.1
Africa	5,090,593	2.88	135,083	3.54	2.7
Oceanía	70,306	0.04	1,255	0.03	1.8

**América, tiene el 40 % de casos confirmados (70,833,139 /176,785,989) y el 49 % (1,851,919/3,820,912)
Letalidad 2.6 %**

**Europa (Francia y Rusia), NA/CA/C (EEUU y México), Asia (India y Turquía), Suramérica (Brasil, Argentina),
África (Sudáfrica y Marruecos), Oceanía (Australia y Polinesia Francesa).**



Distribución nuevos casos y fallecidos en los últimos 7 días por COVID-19 en regiones del mundo. 14-06-2021


País, Otros	Casos en los últimos 7 días	Casos en los 7 días anteriores	Caso semanal % de cambio	Casos en los últimos 7 días/1M pop	Muertes en los últimos 7 días	Muertes en los 7 días anteriores	Variación semanal del porcentaje de mortalidad	Muertes en los últimos 7 días/1M pop
Mundo	2,666,097	3,032,765	-12%	344	64,410	70,219	-8%	8
Europa	280,729	324,785	-14%	375	6,552	7,774	-16%	9
Norteamérica	179,669	193,837	-7%	303	4,982	4,710	6%	8
Asia	1,114,119	1,438,348	-23%	240	23,410	31,294	-25%	5
Suramérica	970,567	989,111	-2%	2,240	27,126	24,482	11%	63
África	120,061	85,852	40%	93	2,340	1,957	20.0%	2
Oceania	952	828	15%	23	0	2	-100%	0.0



Casos de COVID-19 en el mundo




Casos de COVID-19 por millón en países del mundo al 13-06-2021






Fallecidos por millón por COVID-19 en países del mundo al 13-06-2021






Distribución nuevos casos y % de variación en los últimos 7 días por COVID-19 en Países del Mundo. 13-06-2021






Distribución nuevos casos por millón de hab en los últimos 7 días por COVID-19 en el Mundo 13-06-2021





Distribución nuevos fallecidos por millón en los últimos 7 días por COVID-19 en Países del Mundo. 13-06-2021





Países del mundo con mas variación de casos por COVID-19 confirmados en el mundo en últimos 7 días 14-06-2021

#	País, Otros	Casos en los últimos 7 días	Caso semanal % de cambio
1	Camerún	1,161	116100%
2	Sierra Leona	161	243%
3	Liberia	234	230%
4	Ruanda	935	193%
5	Zimbabwe	684	191%
6	Zambia	10,792	125%
7	Suazilandia	96	104%
8	Mauricio	155	89%
9	Hong Kong	26	86%
10	Malawi	101	84%
11	Lesotho	22	83%
12	Namibia	6,148	81%
13	Mali	53	71%
14	Nueva Zelanda	20	67%
15	República Centroafricana	10	67%
16	Guinea	134	61%
17	Yemen	77	57%
18	República Democrática Congo	2,153	56%
19	Kenya	2,851	55%
20	Reino Unido	47,869	52%



Alerta Epidemiológica Mucormicosis asociada a la COVID-19.

11 de junio de 2021



Alerta Epidemiológica Mucormicosis asociada a la COVID-19.

11 de junio de 2021

- En los últimos meses, se ha observado un aumento de informes sobre casos de mucormicosis asociada a la CO-VID-19 (CAM, por sus siglas en inglés COVID-19 Associated Mucormycosis)
- Enfermedades subyacentes:
 - diabetes mellitus(DM),
 - cetoacidosis diabética
 - tratamiento con esteroides.
- Forma clínica más frecuente es la mucormicosis rino-orbital, seguida de la mucormicosis rino-orbito-cerebral.
- India, mayor cantidad de casos detectados se estima más de 4.000 personas con CAM.



Alerta Epidemiológica Mucormicosis asociada a la COVID-19. 11 de junio de 2021

- En un estudio retrospectivo multicéntrico en India entre septiembre-diciembre de 2020, se encontró que entre 287 pacientes con mucormicosis, 187 (65,2%) tenían CAM; con una prevalencia de 0,27 % entre los pacientes hospitalizados con COVID-19. Aumento 2.1 veces que en el mismo período del año 2019.
- 187 pacientes con CAM,
 - 80,2% eran hombres,
 - 32,6 % presentaban COVID-19 como única enfermedad subyacente,
 - 78,7 % fueron tratados con glucocorticoides por la COVID-19,
 - 60,4 % tenían diabetes mellitus,
 - 62,6 % tuvieron mucormicosis rino-orbital y 23,5 % rino-orbito-cerebral.
- Casos en Brasil, Chile, Estados Unidos de América, Honduras, México, Paraguay, Uruguay, Italia y Reino Unido.



Alerta Epidemiológica Mucormicosis asociada a la COVID-19. 11 de junio de 2021

- Generalmente la mucormicosis se debe sospechar en pacientes con diabetes mellitus (DM), especialmente aquellos con cetoacidosis diabética, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, inmunosupresión iatrogénica, pacientes oncohematológicos (principalmente trasplantes alogénicos de médula ósea) y trasplantados de órganos sólidos.




Alerta Epidemiológica Mucormicosis asociada a la COVID-19. 13 de junio de 2021

#	Edad en años	Sexo	Enfermedades subyacentes y comorbilidades	Presentación clínica-Mucormicosis	Estado
1	67	Masculino	Diabetes mellitus	Pulmonar	En evolución
2	68	Masculino	Diabetes mellitus, Hipertensión arterial, Dislipidemia, Micosis de conducto auditivo externo tratada	Rino-orbital	En evolución
3	35	Masculino	Diabetes no controlada, obesidad	Rino-orbito-cerebral	En evolución
4	70	Masculino	Enfermedad cardíaca, Hipertensión arterial	Rino-orbito-cerebral	En evolución
5	56	Masculino	Hipertensión arterial, Asma	Rino-orbital	En evolución
6	45	Femenino	Hipertensión arterial, Diabetes mellitus	Rino-orbital	En evolución
7	52	Femenino	Sobrepeso, Tabaquismo	Rino-orbital	En evolución
8	24	Femenino	Diabetes mellitus Rinosinusitis, Cetoacidosis diabética grave, Acidosis metabólica grave, Neumonía atípica	Rino-orbital	Fallecida
9	51	Femenino	Diabetes mellitus, Insuficiencia renal crónica	Rino-orbital	Fallecida
10	33	Femenino	Diabetes no controlada, Hipertensión arterial, Asma	Rino-orbito-cerebral	Fallecida
11	51	Femenino	Diabética tipo 2 IR, mal compensada, hipertensa crónica, obesidad (IMC sobre 30), Neumonía COVID-19 grave, falla respiratoria aguda severa.	Rino-orbital	Fallecida
12	74	Femenino	Hipertensión arterial, Diabetes mellitus	Rino-orbital	Fallecida
13	49	Masculino	Compromiso del sistema inmune	Pulmonar	Fallecido
14	35	Masculino	Diabetes mellitus tipo 2 no controlada	Rino-orbito-cerebral	Fallecido
15	60	Masculino	Diabetes no controlada, Hipertensión arterial, Asma	Rino-orbital	Fallecido
16	61	Masculino	Enfermedad cardíaca, Trasplante pulmonar	Pulmonar	Fallecido
	50.75				

Promedio de edad 51 años, 56 % son varones, 19 % es pulmonar, 56 % Rino Orbital, 25 % de Rino- orbito-cerebral y el 56 % falleció

Mucormicosis



Cigomicosis

Descrita por primera vez en 1885 por Paltauf.

La mucormicosis (cigomicosis) es una infección micótica invasora poco común, fulminante y aguda, caracterizada por inflamación y trombosis vascular, causada por invasión de los hongos oportunistas en las paredes y luz de los vasos.

Es causada por hongos saprófitos aerobios, generalmente no patógenos para el hospedero inmunocompetente.



La infección se adquiere por inhalación de esporas



Las que colonizan los senos paranasales y la nasofaringe.



ocasionalmente se puede adquirir por ingestión inadvertida o inoculación cutánea de esporas.

En huéspedes susceptibles, una adecuada inoculación del hongo puede invadir directamente los canales vasculares, comprometiendo el riego tisular, promoviendo el desarrollo de hipoxia e incrementar la acidosis, iniciando así un círculo vicioso

NO SE HA DOCUMENTADO TRANSMISIÓN PERSONA A PERSONA

Estos hongos muestran alta afinidad por las zonas aireadas del cuerpo, por su metabolismo aeróbico; ello explicaría, en parte, su predilección por el tracto respiratorio y su afinidad por las arterias

PATOGENIA





FACTORES DE RIESGO

La sobrecarga de hierro.
Dado que esta facilita el
crecimiento de los hongos y
aumenta la susceptibilidad

Conforme hay afección de
los vasos sanguíneos, ocurre
trombosis, necrosis hística y
el hongo continua creciendo
en este tejido desvitalizado


Diabetes mellitus,
particularmente aquellos
pacientes con mal control y
acidosis relacionado con
disfunciones de la
inmunidad celular.

1. Pacientes con quemaduras
2. Leucemias
3. Pacientes trasplantados
4. Inmunosupresión
5. Neutropenia prolongada
6. Quimioterapia
7. Alta dosis de esteroides
8. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA
9. Uso de fármacos intravenosos



FORMAS CLINICAS

Dependiendo de donde las esporas del hongo se depositan, se puede afectar los senos, los pulmones, el tracto gastrointestinal, el cerebro o la piel.



LA MUCORMICOSIS ES UNA INFECCIÓN FÚNGICA INFRECUENTE, PERO POTENCIALMENTE LETAL EN LOS SERES HUMANOS. EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO PRECOCES SON FUNDAMENTALES PARA CONSEGUIR SALVAR LA VIDA DEL PACIENTE.

Se aprecia sinusitis etmoidal y cerebritis frontal incipiente.



La tomografía computarizada permite evaluar la extensión de la enfermedad y valorar la excentración(extirpación del órgano) necesaria que requerirá el procedimiento quirúrgico.

La infección que se acompaña de fiebre y creciente obnubilación, suele iniciarse en nariz y senos etmoidales, los signos intranasales de la infección son usualmente inespecíficos e incluyen ingurgitación(congestión vascular) de la mucosa.

MUCORMICOSIS RINOCEREBRAL

- Diabetes tipo I
- Acidosis metabólica
- Transplantes
- Deferoxamina

FACTORES DE RIESGO

FORMA SINUSO-ÓRBITO-CEREBRAL.
SIGNOS Y SÍNTOMAS: FIEBRE, DOLOR RETRO-ORBITARIO, TUMEFACCIÓN DE UN LADO DE LA CARA, CELULITIS ORBITARIA, PROPTOSIS, QUEMOSIS, AMAUROSIS, NECROSIS PALATINA, CONVULSIONES, COMA.



Estudios por imágenes: opacidad de los senos maxilares, tumefacción de las mucosas, destrucción ósea de las paredes de los senos maxilares, signos de celulitis orbitaria, trombosis del seno cavernoso, imágenes de abscesos cerebrales o de vasculitis.



Alerta Epidemiológica Mucormicosis asociada a la COVID-19. 11 de junio de 2021


- Diagnóstico por imágenes: resonancia magnética de los senos paranasales, con estudio de contraste cerebral, para mucormicosis rino-orbito-cerebral (ROCM); tomografía computarizada simple de tórax, para mucormicosis pulmonar.
- Diagnóstico histopatológico: la biopsia de los tejidos afectados es la forma más crítica para el diagnóstico. Para confirmar una infección debe observarse la invasión tisular de las hifas no tabicadas en secciones de tejido teñidas con hematoxilina-eosina (HE), tinción de ácido periódico-Schiff (PAS) o metenamina-plata de Grocott-Gomori (GMS), o ambas.
- Diagnóstico microbiológico:
- **En el caso del procesamiento de biopsias, las mismas no se deben homogeneizar en mortero. Los hongos filamentosos no tabicados o cenocíticos, son muy frágiles y se rompen con facilidad, lo que dificulta la visualización al microscopio y afecta el rendimiento del cultivo.**



Presiona Esc para salir del modo de pantalla completa



**LA TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA ES
ÚTIL PARA EL
DIAGNOSTICO
TEMPRANO, PARA
DEFINIR LA
EXTENSIÓN DE LA
VERDAD Y PARA
CORROBORAR LA
RESPUESTA AL TTO.**




Tomografía computada en corte axial que muestra destrucción septal.



Alerta Epidemiológica Mucormicosis asociada a la COVID-19. 11 de junio de 2021

- Examen microscópico: el examen microscópico es fundamental para realizar un diagnóstico precoz de mucormicosis. Se puede realizar en fresco o blanco de calcofluor (40x) y coloración de Giemsa (100x). Se observan hifas cenocíticas (no tabicadas), anchas (6-16 μm), ramificadas (generalmente en ángulo de 90°).
- Cultivo: los mucorales suelen crecer en los medios de cultivos comúnmente utilizados en micología: agar Sabouraud glucosado o de miel y agar Infusión de cerebro y corazón (BHI); incubación a 28°C y 35-37°C. Los hongos no tabicados son de rápido desarrollo (24-48h).
- Otros medios que pueden utilizarse para favorecer la fructificación son: agar papa glucosado y extracto de malta; y particularmente agar Czapek, para *Saksenaea* y *Apophysomyces*.



Situación epidemiológica y avances de vacunación

Río Amazonas Perú, Colombia y Brasil

COVID-19 en los países andinos

14 de junio 2021 – Hora 8:00



País	Casos Totales	Muertes totales	Total recuperados	Total Casos/ 1 millón de habitantes	Muertes / 1 millón habitantes
Bolivia	406,954	15,542	321,665	34,418	1,314
Chile	1,476,473	30,707	1,399,187	76,613	1,593
Colombia	3,753,224	95,778	3,477,656	73,024	1,863
Ecuador	438,934	21,048	398,645	24,526	1,176
Perú	2,003,625	188,708	SD	59,977	5,649
Venezuela	251,686	2,829	231,558	8,875	100
Total	8,330,896	354,612	5,828,711	50,955	2,169

Elaborado ORAS-CONHU a partir de datos de <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
Institutos Nacionales de Estadística de los países andinos

Avances en la vacunación contra el coronavirus

14 de junio 2021 – Hora 8:00



Países	Dosis administradas		% de población	
	Por 100 personas	Total	Vacunado 1 dosis	Vacunado 2 dosis
Mundo	30	2,327,582,632		
1. Emiratos Árabes Unidos	140	13,684,429		
2. Israel	117	10,618,819	60 %	57 %
3. Malta	115	576,256	67 %	50 %
4. Bahréin	114	1.876.554	62 %	52 %
5. Aruba	112	119,395	61 %	51 %
6. Mongolia	109	3,528,572	59 %	51 %
7. Chile	107	20,223,473	61 %	47 %
8. Reino Unido	105	70,253,625	61 %	44 %
9. Curazao	102	160.585	55 %	47 %
10. Katar	98	2,768,028	56 %	42 %
11. Hungría	96	9.424.351	54 %	42 %
12. Uruguay	93	3,224,002	60 %	33 %
13. Estados Unidos	92	306,509,795	52 %	43 %

Fuente: OurWorldInData y The New York Times

<https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html>

Avances en la vacunación contra el coronavirus

Países Andinos 14 de junio 2021 – Hora 8:00



Puesto	Países	Principales vacunas	Dosis administradas		% de población	
			Por 100 personas	Total	Vacunado 1 dosis	Vacunado 2 dosis
90	Bolivia	Oxford / AstraZeneca, Sinopharm / Sputnik V	17	2,065,291	13 %	3,9 %
7	Chile	Pfizer / BioNTech, Sinovac	107	20,223,473	61 %	47 %
75	Colombia	Pfizer/BioNTech, Sinovac	24	12,917,941	17%	7.1%
91	Ecuador	Pfizer/BioNTech	16	2,788,245	11%	5.2%
94	Perú	Pfizer / BioNTech, Sinopharm /	15	5,371,672	10 %	5,1 %
140	Venezuela	Sputnik V	2.6	739,962	2,1 %	0,5 %

Dosis aplicadas: 44,106,584

Fuente: Ministerios de Salud Andinos, OurWorldInData y The New York Times
<https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html>

A wide-angle photograph of the Salar de Uyuni in Bolivia. The image shows a vast, flat landscape covered in wet salt flats that perfectly reflect the sky and the clouds above. A single person is walking across the middle ground, their silhouette clearly reflected in the water. The sky is a deep blue, filled with large, white, fluffy clouds. The overall scene is surreal and breathtaking.

BOLIVIA

Salar de Uyuni



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES

REPORTE COVID-19 EN BOLIVIA

Domingo, 13 de junio de 2021

Nº 455

TOTAL
CASOS

406.954

DESCARTADOS

1.236.675

HOY + 5.395

TOTAL
RECUPERADOS

321.665

TOTAL DECESOS

15.542

HOY + 57

ACTIVOS

69.747

TASA DE LETALIDAD

1ra. OLA 6,2%

2da. OLA 2,6%

3ra. OLA 2,4%

1.999 Recuperados

1.607 Casos nuevos

PANDO

0 Recuperados

BENI

0 Recuperados

LA PAZ

251 Recuperados

SANTA CRUZ

1.165 Recuperados

COCHABAMBA

428 Recuperados

ORURO

32 Recuperados

CHUQUISACA

72 Recuperados

POTOSÍ

37 Recuperados

TARIJA

14 Recuperados

CASOS NUEVOS POR DEPARTAMENTO

LA PAZ 554

COCHABAMBA 322

SANTA CRUZ 350

ORURO 84

CHUQUISACA 180

PANDO 15

POTOSÍ 44

TARIJA 33

BENI 25

#Unidos
ContraElCovid

<https://www.minsalud.gob.bo/>

Avances vacunación COVID-19 Bolivia

REGÍSTRATE


¿Cómo registrarse?



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA


MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES


REPORTE DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 AL 12 DE JUNIO DE 2021



CHILE

Salto del Laja, Chile





Avances vacunación COVID-19 - Chile



Jornada 10 de junio

Total personas vacunadas

1era dosis o dosis única



11.330.830

Total dosis administradas



20.223.473

Personas que completaron sus dos dosis



8.892.643

Población objetivo 1era dosis

75,8%

Población objetivo 1era y 2da dosis

58,5%

Chile comenzó vacunación en diciembre de 2020

LUNES 14	MARTES 15	MIÉRCOLES 16	JUEVES 17	VIERNES 18	Fin de semana
• Primera dosis personas de 21 años	• Primera dosis personas de 21 años	• Primera dosis personas de 20 años	• Primera dosis personas de 20 años	• Rezagados de 20 y 21 años	• Segunda dosis • Vacunación embarazadas*
• Segunda dosis a población vacunada con primera dosis entre el 17 y el 23 de mayo					• Rezagados de 20 y más años
• Vacunación embarazadas*					
• Rezagados de 22 o más años					



Comienza el proceso de vacunación para adolescentes



ISP valida uso de emergencia de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson a través de mecanismo COVAX



Ministro del Trabajo invita al sector privado a sumarse a campañas de vacunación de trabajadores

<https://www.gob.cl/yomevacuno/>

Parque Nacional Natural Sumapaz. Colombia

COLOMBIA



Contexto más afectado

- ❖ Bogotá 1,079,120
- ❖ Antioquia (Medellín) 578,317
- ❖ Valle del Cauca (Cali) 289,148
- ❖ Atlántico (Barranquilla) 280,382
- ❖ Cundinamarca (sin Btá) 188,243
- ❖ Santander (Cúcuta) 157,266
- ❖ Bolívar (Cartagena) 115,359

Colombia, vuelve a batir su récord de fallecimientos por COVID-19 tras sumar 586 este domingo.

Departamento	13/06/2021
BOGOTA	9023
ANTIOQUIA	3771
CUNDINAMARCA	2385
VALLE	1837
SANTANDER	1576
CARTAGENA	848
META	697
BOYACA	668
CORDOBA	660
CALDAS	597
TOLIMA	546
CESAR	523
BOLIVAR	494
NARIÑO	478
BARRANQUILLA	472
NORTE SANTANDER	460
SUCRE	452
RISARALDA	446
ATLANTICO	434
HUILA	405
CASANARE	317
GUAJIRA	257
CAUCA	249
QUINDIO	237
STA MARTA D.E.	221
MAGDALENA	114
ARAUCA	110
GUAVIARE	63
CHOCO	58
CAQUETA	46
PUTUMAYO	28
GUAINIA	23
VICHADA	14
SAN ANDRES	5
VAUPES	4
AMAZONAS	1
TOTAL	28519

<https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html>

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx

casos nuevos: 28.519



Avances vacunación COVID-19 - Colombia



DOSIS ACUMULADAS: 12.917.941

SEGUNDAS DOSIS ACUMULADAS: 3.800.204

CORTE 23:59 · JUNIO · 12 · 2021



<https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx>

<https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx>



ECUADOR

Mindo: El País de la Aves, Ecuador



438.934

Casos confirmados con pruebas PCR



398.645

*Pacientes recuperados

*90,82% pacientes recuperados respecto a confirmados PCR. Los pacientes recuperados son aquellos que han sido ingresado al sistema de vigilancia con al menos una prueba RT-PCR positivo, han pasado al menos 29 días desde la fecha de inicio de síntomas y están vivos. Este indicador se mostrará acumulado semanalmente cada domingo.



*Detalle de fallecidos

Confirmados	Probables	Total
15.483	5.565	21.048

*Fallecidos por Covid-19: corresponde a los fallecidos confirmados con una prueba RT-PCR positiva, fallecidos probables que son las personas con síntomas, otras pruebas de laboratorio o imagen relacionados a Covid-19, sin una prueba RT-PCR.



978.991

Total casos descartados



46.727

Casos con alta hospitalaria



767

Hospitalizados estables



455

Hospitalizados pronóstico reservado



Llamadas 171, relacionadas a Covid 19	Teleconsulta	Atenciones en establecimientos de salud - MSP	Seguimiento telefónico	Seguimiento en domicilio
2.129.720	139.256	27.995	491.950	141.050

- Llamadas al 171 relacionadas a Covid-19: número de llamadas (acumuladas) atendidas por la plataforma 171 relacionadas a Covid-19.
- Teleconsulta: ciudadanos atendidos a través del APP SALUDEc y por un médico del 171.
- Atenciones en establecimientos de salud del MSP: días agendados a través del 171 en establecimientos del primer nivel de atención.
- Seguimiento telefónico: llamadas a pacientes con diagnóstico confirmado, seguidos vía telefónica en primer nivel, por un profesional del MSP.
- Seguimiento en domicilio: visitas domiciliarias a pacientes con diagnóstico confirmado, desde el primer nivel de atención, por un profesional del MSP.

Fuente: Ministerio de Salud Pública





Se han tomado 1.470.353 muestras para RT-PCR.

Este indicador, de actualización diaria, reporta el número acumulado de las muestras tomadas para la realización de la prueba RT-PCR en los laboratorios autorizados en Ecuador. Cabe indicar que puede existir más de una muestra por persona durante el proceso diagnóstico.

Provincia	Confirmados por RT-PCR	Fallecidos confirmados por RT-PCR	Fallecidos probables
Azuay	23.847	494	39
Bolívar	6.613	108	23
Carchi	8.210	274	3
Cañar	5.757	135	15
Chimborazo	8.108	520	137
Cotopaxi	11.284	546	121
El Oro	21.004	1.061	255
Esmeraldas	8.527	385	84
Galápagos	1.453	10	10
Guayas	59.447	2.696	1.908
Imbabura	14.324	405	26
Loja	16.568	550	154
Los Ríos	12.389	483	411
Manabí	31.386	2.492	1.178
Morona Santiago	5.828	58	8
Napo	3.354	106	4
Orellana	3.314	92	23
Pastaza	3.228	85	19
Pichincha	156.531	3.704	371
Santa Elena	4.344	420	281
Sto. Domingo Tsáchilas	11.377	682	142
Sucumbios	5.286	173	7
Tungurahua	13.903	506	338
Zamora Chinchipe	2.852	98	8
Total	438.934	15.483	5.565

A fin de facilitar la lectura del indicador "casos fallecidos" y proporcionar la información desagregada por provincias se desglosa el número de fallecidos con Covid-19 confirmados por una prueba RT-PCR y los fallecidos probables con Covid-19.




% acumulado de casos confirmados por provincia, referente al total nacional


- Menor a 1,043%
- De 1,043% al 1,9%
- De 1,91% al 3,64%
- Mayor igual a 3,65%

La desagregación de casos a nivel provincial, cantonal y tendencias son de pruebas PCR.

Casos confirmados por grupo etario



Casos confirmados por sexo



@Salud_Ec



SaludEcuador

Página 1/5

Avances vacunación COVID-19 - Ecuador



Dosis aplicadas

2,788,245

<https://www.planvacunarse.ec/>

<https://www.coronavirusecuador.com/>




¡RECUERDA!



Aunque hayas recibido las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19 debes mantener las medidas de bioseguridad para estar libre del virus.

¡NO BAJES LA GUARDIA!



¡No te aglomeres! Mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas.



Usa siempre la mascarilla y asegúrate de cubrir completamente nariz y boca.



Lava tus manos con frecuencia.



Lenín





PERÚ

Laguna Chinancocha(Llanganuco). Parque Nacional Huascarán

CASOS POSITIVOS DE COVID 19, SEGÚN ETAPA DE VIDA PERÚ 2020-2021

2020-2021

Etapa de vida	N°	Tasa de ataque	Razón de tasas
Niño (0 – 11 años)	57,371	0.89	0.14
Adolescente (12 – 17 años)	59,683	1.92	0.31
Joven (18 – 29 años)	399,273	6.22	1.00
Adulto (30 – 59 años)	1,131,588	9.06	1.46
Adulto mayor (60 a más años)	355,710	8.59	1.38
Total	2,003,625	6.14	

Tasa de Ataque x 100


El mayor porcentaje de casos se presenta en los adultos que acumulan el 56% de los casos. ***Las mayores tasas de ataque corresponde al grupo de adultos y adulto mayor.***

Considerando a los jóvenes como grupo de referencia para la razón de tasas, se evidencia que ***el mayor riesgo de enfermar ocurre en los adultos con un 46% y en los adultos mayores con 39%.***

En el 2020, el 51.5% de los casos corresponden a personas de sexo masculino y 48.5% a personas de sexo femenino.

En el 2021, el 51.3% de los casos corresponden a personas de sexo masculino y 48.7% a personas de sexo femenino.

Rt-PCR + PR + AG



Avances vacunación COVID-19 - Perú



“LA VACUNA es vida”

Contador de vacunados

Información actualizada al día de hoy.

[Ver detalles en datos abiertos](#)

Total: 1ra dosis

3,496,945

Personas

Total: 2da dosis

1,874,727

Personas

Ayer: 1ra dosis

46,987

Personas

Ayer: 2da dosis

59,428

Personas

Total de dosis administradas
(1ra y 2da dosis)

5,371,672

Dosis administradas ayer (1ra y
2da dosis)

106,415

Total de personas vacunadas (ambas dosis)

1,874,727

<https://gis.minsa.gob.pe/GisVisorVacunados/>

VENEZUELA

Laguna de Mucubají, Mérida, Venezuela

Casos Positivos

251.686

Casos Recuperados


231.558

Fallecidos


2.829




Casos Nuevos



Fallecidos por día



Distribución por sexo



Mujeres: 120,470

Hombres: 131,216

<https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/>

Avances vacunación COVID-19 - Venezuela



Vicepresidenta denunció que los últimos pagos hechos por Venezuela al Sistema COVAX han sido bloqueados y están bajo investigación según indica un comunicado de la asociación Gavi.

Dosis administradas
739,962

<http://www.mpps.gob.ve/>



XXXIX REUNIÓN DE MINISTRAS Y MINISTROS DE SALUD DEL ÁREA ANDINA

11 de junio de 2021







**Solo estaremos
seguros cuando todos
estemos seguros.**

**Reconstruir nuestra
sociedad con justicia
social y ambiental
para que todas las
personas vivan con
dignidad.**

.

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

Cada vez más juntos por el derecho a la salud



GRACIAS

Muchas gracias a los Ministros de Salud, a los grupos de trabajo, al CTC, a los Comités Andinos y al equipo técnico ORAS-CONHU.

www.orasconhu.org



50

Aniversario
ORAS-CONHU

Juntos somos más fuertes

