



COMUNICADO N° 22

SITUACIÓN DEL SARAMPIÓN EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS Y EN LOS PAÍSES ANDINOS

El Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) alerta el rápido incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas.

Durante el año 2025 se confirmaron 14.891 casos de sarampión en la región, la cifra más alta desde 2019. En las primeras semanas de 2026 ya se han registrado más de 1.000 casos, donde los países con mayor número de casos recientes incluyen México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Bolivia y Uruguay.

En los países andinos, el sarampión se ha presentado de la siguiente manera: Bolivia notificó 597 casos confirmados en 2025 y 10 casos adicionales en 2026; Chile confirmó un caso importado en 2026; Colombia confirmó tres casos en 2026; Ecuador y Venezuela no han reportado casos recientes pero mantienen vigilancia activa; Perú registró 5 casos en 2025 y 17 casos confirmados hasta la semana epidemiológica 13, correspondiente al periodo del 29 de marzo al 4 de abril de 2026, la mayoría asociados a un brote en Puno, lo que marca un cambio en el patrón epidemiológico hacia cadenas de transmisión local.

El aumento del sarampión en las Américas responde a una combinación peligrosa: la disminución de las coberturas de vacunación (el 78% de los casos confirmados en 2025 no estaban vacunados), la acumulación de niños y jóvenes que no recibieron sus dosis durante la pandemia, la movilidad internacional y los eventos masivos que facilitan la introducción del virus, y la presencia de comunidades con baja aceptación vacunal.

Como el sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo, basta que una persona infectada llegue a una zona con brechas de vacunación para que el brote se expanda rápidamente, afectando sobre todo a niños menores de 5 años, adolescentes y adultos jóvenes sin protección. Esto expone a miles de personas a complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera y muerte.

Los Ministerios de Salud de los países andinos han reforzado la vigilancia, la búsqueda activa de casos y las acciones de vacunación en zonas de riesgo. ORAS-CONHU, junto con OPS/OMS, está fortaleciendo la coordinación subregional para asegurar una respuesta rápida y coherente. Sin embargo, la medida más importante depende de cada familia: la vacunación.



ORGANISMO ANDINO DE SALUD CONVENIO HIPÓLITO UNANUE

La vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas) es segura, gratuita y está disponible en todos los países andinos. Protege a niñas, niños, adolescentes y adultos. No esperes a que toque tu puerta. Revisa hoy mismo el carné de vacunación de tu familia y acude al centro de salud más cercano.

Para niñas y niños:

- Primera dosis (SRP1): a los 12 meses
- Segunda dosis (SRP2): entre los 15 y 18 meses
- Dosis adicional (dosis cero): entre los 6 y 11 meses en zonas de riesgo

Para adolescentes y adultos:

- Si no cuentan con dos dosis o no recuerdan haber sido vacunados, deben acudir al establecimiento de salud más cercano

Completar el esquema de vacunación es fundamental para proteger a las comunidades y evitar brotes.

El ORAS-CONHU reafirma su compromiso de coordinar la respuesta ante esta emergencia junto con los Ministerios de Salud, con el objetivo de que nuestra subregión vuelva a estar libre de enfermedades transmisibles prevenibles por vacunación.

Lima, 9 de abril de 2026